

EFFIPRO SPOT-ON KAT | 4 PIPETTEN

Doeldier(en):	Kat.
Leeftijd:	Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze:	Spot-on oplossing.
Werkzaam tegen:	Vlooien, Teken.
Omschrijving:	Vlooien- en tekenbestrijding.
Contra-indicaties:	In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 2 maanden oud of die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.
Dosering/Toediening:	Alleen voor uitwendig gebruik. Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet zodat alle vloeistof zich onderin bevindt. Knip of breek het topje van de pipet af langs de breuklijn. Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.
Werkzame bestanddelen:	Bevat per pipet 50 mg fipronil.
Bijwerkingen:	Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
Waarschuwingen:	Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de blootstelling tegen teken is behandeld, zullen teken binnen de eerste 24-48 uur gedood worden na de aanhechting. Eenmaal dood zullen teken van het dier vallen of, indien ze achter blijven, kunnen ze makkelijk verwijderd worden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met shampoo op de effectiviteit van het product bij katten. Gebaseerd op de gegevens bij de hond, heeft wassen met shampoo één uur voorafgaand aan de behandeling geen invloed op de effectiviteit van het product tegen vlooien. Behandel in geval van een massale infestatie de omgeving met een geschikte omgevingspray om de werkingsduur van het product te maximaliseren. Voor optimale vlooienbestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten tegelijkertijd te worden behandeld. Laboratoriumstudies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn. Studies bij drachtige en zogende poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de dierenarts.
Verpakking:	Doos à 4 pipetten.

Verdere info:

Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk
op Fidin Online Repertorium <http://repertorium.fidin.nl>